

## Mieszanka paszowa uzupełniająca W EXTRA

stosować do sporządzania paszy pełnoporcjowej  
dla warchlaków i tuczników: 15% (max. 17,5%)

dla tuczników powyżej 75 kg 12,5% MPU

Produkt przeznaczony dla trzody chlewnej

Skład: poekstrakcyjna śruta sojowa, węgiel wapnia, fosforan jednowapniowy, chlorek sodu, fosforan wapniowo-sodowy, tlenek magnezu, węgiel wapniowo-magnezowy, olej roślinny rzepakowy.

Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie.

Składniki analityczne w 1 kg mieszanki:

Białko surowe	%	40,00	Wapń ogólny	%	4,35
Oleje i tłuszcze surowe	%	1,50	Fosfor ogólny	%	1,01
Włókno surowe	%	3,00	Sód	%	0,92
Popiół surowy	%	19,00	Lizyna	%	4,20
Energia metaboliczna	MJ/kg	11,80	Metionina	%	0,60

Dodatki dietetyczne:

Lizyna (L-lizyna monohydrochloride, 3:2:8) 16,75g, witamina A 3a672a 29100j.m., witamina D<sub>3</sub> E57 8900i.m., witamina E 3a700 500mg, miedź E4 (siarczan miedzi, 5-wodny) 90mg, żelazo E1 siarczan żelaza (II) jednowodny 450mg, cynk E6 tlenek cynku 360mg, mangan E5 tlenek manganowy 315mg, selen E8 selenin sodu 1,8mg.

Dodatki zootechniczne:

6-fityta (EC.3.1.3.26), 4a1641 4500 FYT.

Dodatki technologiczne:

galusan propylu E310, tokoferol naturalny E306, kwas cytrynowy E330.

Stosować dla warchlaków: od 30 żywej wagi w ilości – 15 % (max. 17,5% MPU),  
dla tuczników: od 75 do 110 kg żywej wagi w ilości – 12,5 % MPU. + 87,5 % śruty zbożowej

	30-75 kg wagi		
MPU W EXTRA	15	15	15
Jęczmień	35	45	35
Pszenica	35	40	30
Kukurydza			15
Pszenżyto	15		
Otręby pszenne			5

	75-110 kg wagi		
MPU W EXTRA	12,5	12,5	12,5
Jęczmień	35	25	30
Pszenica	38	32,5	18
Kukurydza	14,5		15
Zyto/ pszenżyto		30	24,5

## Nowoczesna technika żywienia zwierząt

**Mieszanka uzupełniająca W extra** – jest to dobrze zbilansowana mieszanka uzupełniająca do sporządzania paszy pełnoporcjowej dla warchlaków i tuczników, zawierająca w swoim składzie wyłącznie białka pochodzenia roślinnego – **tylko i wyłącznie śruta sojowa**.

Oprócz szeregu witamin, mikro- oraz makroelementów, zawiera optymalną ilość poszczególnych aminokwasów oraz fitazę.

Jej skład pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich parametrów mięsności tuczników oraz wysokich przyrostów dobowych zwierząt przy niskim zużyciu paszy na kilogram przyrostu.

Stosować dla warchlaków: od 30 kg żywej wagi w ilości – 15 % (max. 17,5% MPU),

dla tuczników: od 75 do 110 kg żywej wagi w ilości – 12,5 % MPU. + 87,5 % śruty zbożowej